

CONCOURS COMMUN 1998

DES ÉCOLES DES MINES D'ALBI, ALÈS, DOUAI, NANTES

Épreuve spécifique de Mathématiques (filière MPSI)

Mercredi 20 mai 1998 de 08h00 à 12h00

Instructions générales :

Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.

PREMIER PROBLÈME

\mathbb{R} désigne l'ensemble des nombres réels.

On considère n et p deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2.

On notera $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels, $GL_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

I_n désigne la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire la matrice diagonale d'ordre n dont les termes diagonaux sont tous égaux à 1.

Le but de ce problème est l'étude des ensembles

$$\mathcal{R}_n(p) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^p = I_n\}.$$

Dans la deuxième et la troisième partie, E désigne un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension 2 muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$, et Id_E désigne l'identité de E .

I. Généralités

- 1) $\mathcal{R}_n(p)$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?
- 2) Soit $A \in \mathcal{R}_n(p)$. Montrer que $A \in GL_n(\mathbb{R})$ et que $A^{-1} \in \mathcal{R}_n(p)$.
- 3) Soit $A \in \mathcal{R}_n(p)$ et $P \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer que $P^{-1}AP \in \mathcal{R}_n(p)$.
- 4) Montrer que $\mathcal{R}_n(p) \cap \mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ est un ensemble fini dont on déterminera le cardinal.
- 5) On considère q un entier naturel supérieur ou égal à 2, et on appelle d le plus grand diviseur commun de p et q . Montrer que $\mathcal{R}_n(p) \cap \mathcal{R}_n(q) = \mathcal{R}_n(d)$.

II. Etude de $\mathcal{R}_2(2)$

- 1) Soit A un élément de $\mathcal{R}_2(2)$ tel que $A \neq I_2$ et $A \neq -I_2$, et soit u l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base \mathcal{B} est A .
 - a) Montrer que $\text{Ker}(u - Id_E) \oplus \text{Ker}(u + Id_E) = E$.
 - b) En déduire qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

- c) Montrer qu'il existe quatre réels a, b, c et d tels que $ad - bc \neq 0$ et

$$A = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad + bc & -2ab \\ 2cd & -ad - bc \end{pmatrix}.$$

- 2) Montrer que $\mathcal{R}_2(2)$ muni de la multiplication des matrices n'est pas un groupe. Interpréter géométriquement ce résultat.

III. Etude de $\mathcal{R}_2(3)$

Dans toute la suite du problème, M désigne un élément de $\mathcal{R}_2(3)$, et v l'endomorphisme de E dont la matrice dans \mathcal{B} est M . On considère les sous-espaces vectoriels de E :

$$F = \text{Ker}(v - Id_E) \quad \text{et} \quad G = \text{Ker}(v^2 + v + Id_E)$$

où $v^2 = v \circ v$.

- 1)
 - a) Montrer que $F \cap G = \{0\}$.
 - b) Soit $x \in E$. Montrer que $\frac{1}{3}(x + v(x) + v^2(x)) \in F$ et que $\frac{1}{3}(2x - v(x) - v^2(x)) \in G$.
 - c) En déduire que $E = F \oplus G$.
- 2) Que peut-on dire de M si F est de dimension 2 ?
- 3) Le but de cette question est de montrer à l'aide d'un raisonnement par l'absurde que F n'est pas de dimension 1. On suppose donc que F est de dimension 1.
 - a) Montrer qu'il existe une base $\mathcal{G} = (g_1, g_2)$ de E telle que F soit la droite vectorielle engendrée par g_1 et G soit la droite vectorielle engendrée par g_2 .
 - b) En considérant le vecteur $v^2(g_2) + v(g_2) + g_2$, obtenir une contradiction.
- 4) On suppose dans cette question que F est de dimension 0.
 - a) Montrer que $(e_1, v(e_1))$ est une base de E .
 - b) En déduire qu'il existe un réel a et un réel non nul b tels que

$$M = \frac{1}{b} \begin{pmatrix} ab & -1 - a - a^2 \\ b^2 & -ab - b \end{pmatrix}.$$

DEUXIÈME PROBLÈME

- 1) Résoudre dans \mathbb{R} l'équation : $t + \sin t = 0$.
- 2) Pour tout réel t tel que $t + \sin t \neq 0$, on pose :

$$\psi(t) = \frac{1}{t + \sin t}.$$

Montrer que l'intégrale $\int_x^{2x} \psi(t) dt$ est définie pour tout $x \in \mathbb{R}^*$.

On notera $f(x)$ sa valeur.

L'objet de ce problème est l'étude de la fonction f associée, définie sur \mathbb{R}^* .

- 3) Soit $x_0 > 0$. La fonction ψ est-elle intégrable sur $]0, x_0]$?

- 4) Etudier la parité de f .
- 5) Montrer que f est de classe C^∞ sur \mathbb{R}^* , et calculer $f'(x)$ sous forme factorisée pour $x > 0$.
- 6) En déduire le sens de variation de f sur $]0, +\infty[$.
- 7) On cherche à étudier le comportement de f au voisinage de $+\infty$.
 - a) Montrer que, pour tout $x > 0$,

$$\left| f(x) - \int_x^{2x} \frac{dt}{t} \right| \leq \int_x^{2x} \frac{dt}{t(t + \sin t)}.$$

- b) Montrer qu'il existe $m > 0$ tel que, pour tout $t \geq m$, on ait : $t + \sin t \geq \frac{t}{2}$.
 - c) En déduire que $f(x)$ admet une limite finie quand x tend vers $+\infty$.
- 8) On cherche à étudier le comportement de f au voisinage de 0.
 - a) Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que

$$\frac{1}{t + \sin t} = \frac{a}{t} + bt + o(t)$$

au voisinage de 0.

- b) Soit g une fonction de $]0, +\infty[$ dans \mathbb{R} telle que $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 0$. Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sup_{t \in [x, 2x]} |g(t)| = 0.$$

- c) En déduire que si h est une fonction continue de $]0, +\infty[$ dans \mathbb{R} telle que $h(x) = o(x)$ au voisinage de 0, alors $\int_x^{2x} h(t) dt = o(x^2)$ au voisinage de 0.
 - d) Montrer que f admet au voisinage de 0 un développement limité à l'ordre 2 que l'on déterminera.
 - e) Montrer que f peut se prolonger en 0 en une fonction dérivable (on notera encore f ce prolongement), et déterminer $f(0)$ et $f'(0)$.
 - f) Quelle est, au voisinage de 0, la position de la courbe représentative de f par rapport à sa tangente au point d'abscisse 0 ?
 - g) Déterminer un équivalent simple de $f'(x)$ au voisinage de 0.
 - h) En déduire que f est deux fois dérivable en 0, et calculer $f''(0)$.
- 9) Déterminer le tableau de variations de f sur \mathbb{R} .